

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : ریز رخساره ها، میکروفاسیس

رشته تحصیلی/کد درس : زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)، زمین شناسی (کاربردی)، زمین شناسی (محض) ۱۱۱۶۲۴۶ - چینه نگاری و دیرینه شناسی، زمین شناسی ۱۱۱۶۳۳۵

۱ - میکروفاسیس های آهکی میکرو کریستالین با عناصر آلومین چه مشخصاتی دارند؟

۱. حاوی عناصر آلومین و سیمان اسپارایتی هستند.
۲. حاوی عناصر آلومین ولی فاقد سیمان هستند در محیط های پر انرژی تشکیل شده اند.
۳. حاوی عناصر آلومین ولی فاقد سیمان هستند.
۴. حاوی عناصر آلومین و سیمان اولیه هستند.

۲ - توضیح زیر در مورد کدامیک از انواع کلسیت اسپارای است؟

"بلورهای معمول کوچک و رومبئی هستند که در بین عناصر سازنده یا دانه های سنگ گسترش دارند"

۱. کلسیت موزاییکی
۲. کلسیت غدهای
۳. کلسیت اپی تاکسیال
۴. کلسیت فرینج

۳ - در رده بندی دانه هام ، گرینستون دارای کدامیک از ویژگی های زیر است؟

۱. فاقد دانه یا Grain است.
۲. سرشار از گل های کربناته است.
۳. دانه محور یا Grain supported است.
۴. در محیط کم انرژی تشکیل می شود.

۴ - در رابطه با میکروفاسیس ها و انرژی محیط کدام گزینه صحیح است؟

۱. وکستون در محیط های با انرژی بالا تشکیل می شود.
۲. وکستون در محیط های با انرژی پایین تشکیل می شود.
۳. گرینستون در محیط های با انرژی پایین تشکیل می شود.
۴. مادستون در محیط های با انرژی بالا تشکیل می شود.

۵ - در میکرو فاسیس های دارای بافت تخریبی که حاوی کانی فلدرسپات هستند، کدامیک از انواع جانشینی و تغییر رخ می دهد؟

۱. دولومیتی شدن
۲. کلسیتی شدن
۳. گلوکونیتی شدن
۴. کلریتی شدن و سریسیتی شدن

۶ - کدام گزینه در مورد سیمانی شدن درست است؟

۱. در پدیده دیاژنر کانی های اپال و کلسدوئن به کوارتز تبدیل می شوند.
۲. در پدیده دیاژنر کانی کوارتز به کالسدوئن تبدیل می شود.
۳. سیمان های آهنی در دیاژنر نواحی سرد روی می دهد.
۴. در اکثر موارد فضای خالی بین دانه های ماسه سنگ توسط فسفات پر می شود.

۷ - نقش فرامینیفرها از چه زمانی در مطالعه میکروفاسیس ها اهمیت پیدا کرده است؟

۱. کامبرین
۲. تریاس
۳. پرم - کربنیفر
۴. کرتاسه - پالئوسن

سری سوال : یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی :

عنوان درس : ریز رخساره‌ها، میکروفاسیس

رشته تحصیلی/کد درس : زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)، زمین شناسی (کاربردی)، زمین شناسی (محض) ۱۱۱۶۲۴۶ - چینه نگاری و دیرینه شناسی، زمین شناسی ۱۱۱۶۳۳۵

^۸ - در نواحی معتدله رابطه عمق با فراوانی میکروفاسیل‌ها چه رابطه‌ای دارد؟

۱. در منطقه جزرومی **Elphidiidae** گسترش دارند.
۲. در منطقه لیتووال **Rotaliidae** گسترش دارند.
۳. در منطقه لیتووال **Bulminidae** گسترش دارند.

^۹ - شرح زیر در مورد کدامیک از انواع پوسته‌های فرامینیفرها است؟

"از ذرات کلسیتی کروی به ابعاد ۲/۰ میکرون یا بیشتر ساخته شده‌اند که به صورت رشته‌ها و ردیف‌های عمود یا مایل نسبت به سطح صدف قرار دارند. پوسته قاعده‌ای کیتینوئیدی بوده ولی مینرالیزه نیست"

۱. پوسته آهکی گرانولار
۲. پوسته آهکی هیالین
۳. پوسته آهکی پورسلانوز

^{۱۰} - مشخصات زیر در مطالعه پوسته فرامینیفرها در زیر میکروسکوپ و در نور طبیعی و پلاریزه مشاهده می‌شود. نوع پوسته کدام است؟

"به طور همگن تیره و سیاه و گاهی متمایل به قهوه‌ای است. فاقد حفره و منافذ کanal‌ها و عدم وجود لامل"

۱. آهک هیالین
۲. آهک میکرو گرانولار
۳. آهک پورسلانوز
۴. پوسته آگلوتینه

^{۱۱} - کدام گزینه درمورد مسیر تکامل پوسته فوزولین‌ها درست است؟

۱. دیواره صد فوزولین‌های اولیه از کریوتکا تشکیل می‌شده است.
۲. در اثر تکامل صد دوکی شکل فوزولین‌ها به صد نوتیلی شکل تبدیل شده است.
۳. در اثر تکامل اندازه صد فوزولین‌ها کوچکتر شده است.
۴. دیواره صد فوزولین‌های اولیه آهک میکرو گرانولار بوده است.

^{۱۲} - کدامیک از گزینه‌ها درمورد تغییرات ساختمانی آلوئولینای اؤسن درست است؟

۱. حجرات پلوتونه اولیه در اشکال میکروسفریک از بین رفته بودند.
۲. تعداد حجرات در هر دور پیچش کم شده بوده است.
۳. حجم حجرات اولیه کاهش یافته بوده است.
۴. اندازه صد رفته کوچک شده است.

^{۱۳} - جنس «اربیتوئیدس» چه سنی دارد؟

۱. ژوراسیک
۲. تریاس
۳. کربنیفر
۴. کرتاسه

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : ریز رخساره ها، میکرو فاسیس

رشته تحصیلی/کد درس : زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)، زمین شناسی (کاربردی)، زمین شناسی (محض) ۱۱۱۶۲۴۶ - چینه نگاری و دیرینه شناسی، زمین شناسی ۱۱۱۶۳۳۵

۱۴ - مشخصات زیر مربوط به کدام جنس از «نومولیتیده» است؟
پیچش صدف ابتدا اینولوت ولی بعد اولوت می شود. تعداد پیچش محدود و فواصل پیچش از داخل به خارج تصاعدی است.
از کرتاسه پایانی تا عهد حاضر در رسوبات دریایی کم عمق یافت شده است

۱. آسیلینا ۲. اپرکولینا ۳. هتروسترزینا ۴. سپیروکلیپئوس

۱۵ - جنس «میو ژیپسینوئیدس» معرف چه زمانی است؟

۱. پالثوسن ۲. ائوسن ۳. کرتاسه ۴. میوسن

۱۶ - مشخصات زیر مربوط به کدامیک از جنس های فرامینیفرهای پلانکتونیک است?
دارای پیچش تروکو سپیرال، حجرات کروی است آخرین حجره کروی بزرگ بوده و بقیه حجرات را می پوشاند، از میوسن تا عهد حاضر وجود دارد"

۱. اربولینا ۲. گلوبی ژرینا ۳. هدبر گلا ۴. روتالیپورا

۱۷ - کدام ویژگی درمورد «رادیولاریای» گروه ناسلاریا درست است؟

۱. صدف به اشکال کروی دیده می شود.

۲. صدف تقارن مرکزی ندارد ولی تقارن محوری دارد.

۳. داخل صدف از کرات متحده مرکز تشکیل شده است.

۴. فاقد اسکلت بوده و فقط سوزن های منفرد آن در رسوبات دیده می شود.

۱۸ - مشخصات زیر مربوط به کدام تیپ از خارهای خارداران است؟

"خارهای مخروطی شکل کوتاه که در آنها پرده ها یا سپتاها به وسیله بافت بین پرده های از یکدیگر جدا می شوند"

۱. خارهای تیپ سیداریس ۲. خارهای تیپ دیادما ۳. خارهای تیپ اکی نوس ۴. خارهای تیپ اسپاتانگوس

۱۹ - جلبک های ژیمنوکدی اسه شاخص چه زمانی هستند؟

۱. سیلورین تا کربنیفر ۲. پرمین تا کرتاسه ۳. دونین تا پرمین ۴. تریاس تا ژوراسیک

۲۰ - از جلبک های عهد حاضر جلبک های قرمز در چه نواحی گسترش دارد؟

۱. در مرداب ها و نواحی کم عمق دریایی

۲. در محیط های اقیانوسی

۳. در تپه های زیر آب

۴. در محیط های جزرومدمی